

Etat des lieux des émissions polluantes et analyse des secteurs à enjeux sur le territoire du Pays Cœur d'Hérault

ETU-2026-154
Edition Juillet 2026

www.atmo-occitanie.org

contact@atmo-occitanie.org

09 69 36 89 53 (Numéro CRISTAL – Appel non surtaxé)



CONDITIONS DE DIFFUSION

Atmo Occitanie, est une association de type loi 1901 agréée (décret 98-361 du 6 mai 1998) pour assurer la surveillance de la qualité de l'air sur le territoire de la région Occitanie. Atmo Occitanie est adhérent de la Fédération Atmo France.

Ses missions s'exercent dans le cadre de la loi sur l'air du 30 décembre 1996. La structure agit dans l'esprit de la charte de l'environnement de 2004 adossée à la constitution de l'État français et de l'article L.220-1 du Code de l'environnement. Elle gère un observatoire environnemental relatif à l'air et à la pollution atmosphérique au sens de l'article L.220-2 du Code de l'Environnement.

Atmo Occitanie met à disposition les informations issues de ses différentes études et garantit la transparence de l'information sur le résultat de ses travaux. A ce titre, les rapports d'études sont librement accessibles sur le site :

www.atmo-occitanie.org

Les données contenues dans ce document restent la propriété intellectuelle d'Atmo Occitanie.

Toute utilisation partielle ou totale de données ou d'un document (extrait de texte, graphiques, tableaux, ...) doit obligatoirement faire référence à **Atmo Occitanie**.

Les données ne sont pas systématiquement rediffusées lors d'actualisations ultérieures à la date initiale de diffusion.

Par ailleurs, **Atmo Occitanie** n'est en aucune façon responsable des interprétations et travaux intellectuels, publications diverses résultant de ses travaux et pour lesquels aucun accord préalable n'aurait été donné.

En cas de remarques sur les informations ou leurs conditions d'utilisation, prenez contact avec **Atmo Occitanie** par mail :

contact@atmo-occitanie.org

PRÉAMBULE

PAYS CŒUR D'HERAULT - 2023

Objet du rapport

Afin d'accompagner le territoire dans la connaissance des sources locales d'émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre (GES), Atmo Occitanie propose ici une série d'indicateurs relatifs aux émissions évaluées sur le territoire du Pays Cœur d'Hérault ainsi que plusieurs indicateurs de contexte par secteur d'activité, qui permettent de mieux comprendre les différentes sources d'émissions ainsi que leur évolution dans le temps.

Ces indicateurs doivent permettre de répondre aux besoins de reporting des territoires au travers des plans et programmes dans lesquels ils sont impliqués, d'estimer l'évolution des émissions polluantes à long terme, et de confronter les quantifications réalisées à l'échelle d'un territoire aux objectifs nationaux ou régionaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques et de GES, notamment le Plan National de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphérique (PREPA, mai 2017, révisé en 2022) et la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC, avril 2020).

Enfin, l'annexe 1 met l'accent sur **les secteurs du transport routier et du résidentiel, enjeux majeurs du territoire du Pays Cœur d'Hérault**, et présente les indicateurs d'inventaires associés.

Données et période de référence

Les indicateurs Air-Climat-Energie sont issus de l'inventaire régional des émissions polluantes mis en œuvre par Atmo Occitanie notamment pour accompagner les territoires dans la connaissance détaillée de leurs sources émissives locales.

Version de l'inventaire des émissions et période de référence

- Les données d'émissions présentées ici sont issues de la version de l'inventaire suivante :

ATMO_IRS_V9_2008-2023

- Ces données couvrent la période de référence suivante :

[2008 ; 2023]

La période utilisée pour le calcul d'un indicateur est précisée pour chacun d'eux. Les indicateurs relatifs à l'année la plus récente sont donc proposés sur l'année 2023.


LES CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE, SOURCES DE POLLUTION ATMOSPHERIQUE

PAYS CŒUR D'HERAULT - 2023

1. Quel type d'énergie est consommé sur le territoire ?

Consommation énergétique par source d'énergie

Pays Cœur d'Hérault
2023




©Atmo Occitanie - ATMO_IRS_V9_2008_2023

La source d'énergie majoritairement utilisée sur le territoire de Pays Cœur d'Hérault est la source : produit pétroliers (67 %)

2. Quelles activités sont les principales consommatrices d'énergie ?

Consommation énergétique par secteur

Pays Cœur d'Hérault
2023



©Atmo Occitanie - ATMO_IRS_V9_2008_2023

Le premier secteur d'activité consommateur d'énergie sur le territoire de Pays Cœur d'Hérault est le secteur Transports, avec 69% de l'énergie consommée par ce secteur.

Consommation totale
Tous secteurs

En 2023

1 817 GWh

soit 21 MWh par habitant

Pays Cœur d'Hérault

Part de la consommation par rapport au
département

En 2023

9,8%

Pays Cœur d'Hérault

Evolution de la consommation
Tous secteurs

entre 2022 et 2023

-2,9%


Pays Cœur d'Hérault

LES CONSOMMATIONS D'ENERGIE, SOURCES DE POLLUTION ATMOSPHERIQUE PAYS CŒUR D'HERAULT - 2023

3. Quelle est la contribution de chaque secteur d'activité aux émissions de polluants et gaz à effet de serre dans l'air ?

Contribution sectorielle aux émissions de polluants atmosphériques et GES

Pays Cœur d'Hérault
2023



- A l'échelle du Pays Cœur d'Hérault, le secteur des transports reste le premier émetteur de NOx (89%) et de GES (77%). Le secteur résidentiel contribue quant à lui majoritairement aux émissions de particules (PM₁₀ et PM_{2.5}) sur le territoire, notamment via la combustion de bois de chauffage.
- Les deux autres secteurs contribuent de manière moins significative aux émissions de polluants atmosphériques du territoire. Les activités économiques sont par exemple une source non négligeable de polluants : 13% des particules PM₁₀. Enfin, l'agriculture contribue pour moins de 7% aux émissions de polluants atmosphériques.

LES CONSOMMATIONS D'ENERGIE, SOURCES DE POLLUTION ATMOSPHERIQUE

PAYS CŒUR D'HERAULT - 2023

4. Les émissions de particules fines (PM_{2.5}) et leurs sources d'émissions

PM_{2.5}

Les particules fines PM_{2.5} regroupent les particules de diamètre inférieur à 2,5 micromètres. Ces polluants atmosphériques, capables de pénétrer profondément dans les poumons et pour partie dans le système sanguin, ont un impact sanitaire avéré : aggravation de maladies respiratoires et cardiovasculaires, augmentation du risque de cancer du poumon.

Répartition des émissions de particules PM_{2.5} par secteur


Pays Cœur d'Hérault
2023



- **Résidentiel** : 76% des émissions de PM_{2.5} proviennent de ce secteur. La combustion de bois de chauffage est principalement à l'origine des émissions de particules fines (99%) ;
- **Transports** : 15% des émissions de PM_{2.5} proviennent de ce secteur. La combustion des carburants fossiles (diesel, essence) et l'usure des pneus et pièces mécaniques émettent des particules fines ;
- **Activités économiques** : 7% des émissions de PM_{2.5} proviennent de ce secteur.

Tendance des évolutions de particules PM_{2.5}

Pays Cœur d'Hérault



Evolution des émissions PM_{2.5}

entre 2022 et 2023

-4.1%

Pays Cœur d'Hérault

- Le graphique ci-dessus présente l'évolution des quantités de PM_{2.5} émises par an, depuis 2008 pour chaque secteur d'activité.
- Entre 2022 et 2023, les émissions de PM_{2.5} sur le territoire Pays Cœur d'Hérault ont baissé de 4,1%, tous secteurs d'activité confondus. **La population sur ce territoire, dans le même temps, a augmenté de 0,8%.**

LES CONSOMMATIONS D'ENERGIE, SOURCES DE POLLUTION ATMOSPHERIQUE

PAYS CŒUR D'HERAULT - 2023

5. Les émissions d'oxydes d'azote



Les oxydes d'azote (NOx) sont principalement composés de monoxyde d'azote (NO) et de dioxyde d'azote (NO₂). Le NO₂ en particulier a des impacts sanitaires avérés : irritation des voies respiratoires, aggravation de maladies pulmonaires et cardiovasculaires.

Répartition des émissions de NOx par secteur


Pays Cœur d'Hérault
2023



- **Transports** : 89% des émissions de NOx proviennent de ce secteur. Les oxydes d'azote sont émis par des processus de combustion : émissions des moteurs diesel et essence ;
- **Agriculture** : 5% des émissions de NOx proviennent de ce secteur. L'utilisation d'engrais azotés et la gestion des déjections animale émettent des oxydes d'azote.
- **Résidentiel** : 4% des émissions de NOx proviennent de ce secteur. Les oxydes d'azote sont émis par les activités de chauffage des bâtiments : combustion de gaz naturel, de bois de chauffage et de fioul domestique ;
- **Activités économiques** : 2% des émissions de NOx proviennent de ce secteur (incinérateur, industries, chaufferies au gaz,...).

Tendance des évolutions de NOx

Pays Cœur d'Hérault
en tonnes/an



Evolution des émissions NOx
entre 2022 et 2023
-9.2%
Pays Cœur d'Hérault

- Le graphique ci-dessus présente l'évolution des quantités de NOx émises par an, depuis 2008 pour chaque secteur d'activité.
- Entre 2022 et 2023, les émissions de NOx sur le territoire Pays Cœur d'Hérault ont baissé de 9,2%, tous secteurs d'activité confondus.

LES CONSOMMATIONS D'ENERGIE, SOURCES DE POLLUTION ATMOSPHERIQUE

PAYS COEUR D'HERAULT - 2023

6. Les émissions de gaz à effet de serre

GES

Les gaz à effet de serre (GES), comme le dioxyde de carbone (CO₂) ou le méthane (CH₄) jouent un rôle clé dans la régulation du climat en piégeant une partie de la chaleur solaire dans l'atmosphère. La forte augmentation de leur concentration dans l'atmosphère ces dernières décennies renforce l'effet de serre naturel, entraînant un réchauffement climatique accéléré et des conséquences multiples.

Répartition des émissions de GES par secteur


Pays Cœur d'Hérault
2023



- **Transports** : 77% des émissions de GES proviennent de ce secteur. La combustion des carburants fossiles (diesel, essence) émet principalement du dioxyde de carbone ;
- **Résidentiel** : Près de 11% des émissions de GES proviennent de ce secteur. La combustion de gaz naturel, bois de chauffage et fioul domestique est à l'origine d'émissions de dioxyde de carbone.
- **Agriculture** : 7% des émissions de GES proviennent de ce secteur.
- **Activités économiques** : enfin les 5% restant des émissions de GES proviennent de ce secteur.

Tendance des évolutions de GES

Pays Cœur d'Hérault



- Le graphique ci-dessus présente l'évolution des quantités de GES émises par an, depuis 2008 pour chaque secteur d'activité.
- Entre 2022 et 2023, les émissions de GES sur le territoire de Pays Cœur d'Hérault ont baissé de 1,8%, tous secteurs d'activité confondus.

LES CONSOMMATIONS D'ENERGIE, SOURCES DE POLLUTION ATMOSPHERIQUE


PAYS CŒUR D'HERAULT - 2023

7. Focus sur un secteur à enjeu : les transports

- Lien entre consommation énergétique et distance parcourue sur le territoire

Consommation du secteur transports par source d'énergie

Pays Cœur d'Hérault
2023



©Atmo Occitanie - ATMO_IRS_V9_2008_2023

La principale source d'énergie utilisée dans le secteur des transports reste les carburants fossiles.

La consommation énergétique est liée aux distances parcourues.

Comment se répartissent les kilomètres parcourus sur le territoire ?

Pays Cœur d'Hérault
2023



©Atmo Occitanie - ATMO_IRS_V9_2008_2023

- Quelles émissions polluantes sur ce secteur ?

Parmi les transports, le transport routier reste le principal émetteur de polluants atmosphériques. Les principaux polluants émis par le transport routier sont les oxydes d'azote (NOx) et les gaz à effet de serre (GES). Des indicateurs sont présentés ci-dessous pour ces deux polluants.

Répartition des émissions dues au trafic routier par type de route et par polluant

Pays Cœur d'Hérault
2023



©Atmo Occitanie - ATMO_IRS_V9_2008_2023

89% des émissions de NOx et 77% des GES sur le territoire proviennent du trafic routier et proviennent principalement des autoroutes. Les autoroutes émettent les 3/4 des NOx et des GES du trafic routier.

Répartition des kms parcourus et de émissions dues au trafic routier par type de véhicule

Pays Cœur d'Hérault
2023



©Atmo Occitanie - ATMO_IRS_V9_2008_2023

NOx

77% des km parcourus sont réalisés par les véhicules légers. Ces véhicules sont à l'origine de 58% des émissions de NOx et de 56% des émissions de GES.


LES CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE, SOURCES DE POLLUTION ATMOSPHERIQUE PAYS CŒUR D'HERAULT - 2023

8. Focus sur un secteur à enjeu : le secteur résidentiel


➤ Quel type de consommation énergétique sur le secteur résidentiel ?

Consommation du secteur Résidentiel par source d'énergie

Pays Cœur d'Hérault
2023



©Atmo Occitanie - ATMO_IRS_V9_2008_2023



La principale source d'énergie utilisée dans le secteur résidentiel est l'électricité (62%), suivie du bois (17%) et gaz naturel (11%).




➤ Quelles émissions polluantes sur ce secteur et quel type d'énergie y contribue ?

Les particules fines (PM_{2.5}) et les gaz à effet de serre (GES) sont les deux polluants présentant de forts enjeux sanitaire et climatique. Des indicateurs sont présentés ci-dessous pour ces deux polluants.

Répartition des émissions résidentielles et des émissions par source d'énergie

Lodévois et Larzac
2023

Retrouver les autres territoires du Pays Cœur d'Hérault sur <https://www.atmoviz.org/>



PM2.5


Près de 99% des particules fines de ce secteur sont émises par la combustion de bois de chauffage

Evolution des émissions Tous combustibles PM2.5

entre 2022 et 2023

-3%

Pays Cœur d'Hérault



GES

Evolution des émissions Tous combustibles GES

entre 2022 et 2023

-4.8%

Pays Cœur d'Hérault


LES CONSOMMATIONS D'ENERGIE, SOURCES DE POLLUTION ATMOSPHERIQUE

PAYS CŒUR D'HERAULT - 2023

9. La situation du territoire au regard des objectifs nationaux

Evolution des émissions de GES par rapport à la SNBC

Pays Cœur d'Hérault



GES

Les émissions de GES sur le territoire sont comparées aux objectifs définis par la **Stratégie Nationale Bas Carbone** (SNBC 2, 2020), qui indiquent une trajectoire de réduction des émissions de GES jusqu'à 2050. Cette stratégie indique des orientations à mettre en œuvre pour une transition vers une économie bas-carbone, circulaire et durable. La courbe grise indique la trajectoire des émissions polluantes sur le territoire, les points blancs représentent la baisse des émissions attendue par la SNBC entre 1990 et 2050. **En 2023, les émissions de GES de Pays Cœur d'Hérault sont supérieures de 23% à l'objectif de la SNBC.**

Evolution des émissions de PM_{2.5} par rapport au PREPA


Pays Cœur d'Hérault



PM_{2.5}

Evolution des émissions de NO_x par rapport au PREPA

Pays Cœur d'Hérault



NO_x

Les émissions de polluants atmosphériques sur le territoire ont comparées aux objectifs définis par le **Plan National de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques** (PREPA, 2022). Ce plan définit à horizon 2030 des objectifs de réduction des émissions polluantes. La courbe grise indique la trajectoire des émissions polluantes sur le territoire, les points blancs représentent la baisse des émissions attendue selon le PREPA entre 2014 et 2030. **Pour 2023, les objectifs fixés par le PREPA sont respectés pour les particules PM_{2.5} et les NO_x avec des émissions en dessous des objectifs de -7% pour les particules PM_{2.5} et de -14% pour les NO_x.**

ANNEXE 1 – ENJEUX MAJEURS

PAYS CŒUR D'HERAULT

Des enjeux sanitaires et réglementaires qui se renforcent

La qualité de l'air constitue un enjeu majeur pour le territoire du Pays Cœur d'Hérault, tant au regard des impacts sanitaires que des futures obligations réglementaires européennes.

Si la qualité de l'air s'est globalement améliorée, certains secteurs restent exposés à des concentrations de NO₂ et de particules fines proches des futures normes européennes pour la protection de la santé. L'abaissement des valeurs limites réglementaires à l'horizon 2030, motivé par les enjeux sanitaires liés à l'exposition chronique à ces polluants, renforce la nécessité d'accélérer les actions en faveur de la qualité de l'air.

Ces nouvelles valeurs, beaucoup plus proches des recommandations de l'OMS, imposeront une réduction importante de l'exposition des populations urbaines aux concentrations de NO₂ et particules fines PM_{2,5}. Les émissions liées aux transports routiers et à la combustion du bois devront être fortement réduites.

Un enjeu fort lié au trafic routier

Le territoire du Pays Cœur d'Hérault est particulièrement concerné par les émissions issues du trafic routier du fait de la présence d'infrastructures structurantes telles que l'autoroute A75 et les routes nationales et départementales. Le trafic routier constitue ainsi la principale source d'émissions d'oxydes d'azote (89%) et la deuxième source d'émissions de particules en suspension PM₁₀ et particules fines PM_{2,5}. Ces émissions se concentrent surtout à proximité de ces grands axes de circulation.



Les populations à proximité des infrastructures routières restent particulièrement exposées aux concentrations de NO₂ les plus élevées du territoire du Pays Cœur d'Hérault.

Le caractère saisonnier du trafic routier constitue une spécificité du territoire. Durant la période estivale, l'augmentation des déplacements touristiques engendre une hausse notable des flux de circulation sur les principaux axes structurants. Cette pression supplémentaire sur le réseau routier se traduit par une augmentation des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, particulièrement dans les secteurs déjà soumis à une forte fréquentation. La prise en compte de cette variabilité saisonnière apparaît essentielle pour définir des actions adaptées visant à limiter l'exposition des populations aux polluants atmosphériques et à contribuer aux objectifs de transition écologique du territoire.

À court terme, même en l'absence de dépassement réglementaire des seuils actuels pour la protection de la santé, de nombreuses zones du territoire pourraient se situer au-dessus des futures valeurs limites européennes applicables en 2030.

ANNEXE 1 – ENJEUX MAJEURS

PAYS CŒUR D'HERAULT

Les émissions par type de route et de véhicules

Evolution des émissions associées au trafic routier et des kilomètres parcourus sur le territoire ; Comparaison au territoire du PPA

Evolution des émissions polluantes associées au trafic routier sur le territoire entre 2022 et 2023, et depuis 2008.

	Territoire	NO _x	PM ₁₀	PM _{2,5}	GES totaux	Kilomètres parcourus	Population
Evolution entre 2022 et 2023	Pays Cœur d'Hérault	-9%	-4%	-6%	-1%	-1%	0,8%
	Département 34	-7%	-2%	-4%	0%	1%	1,1%


Entre 2022 et 2023, sur le territoire du Pays Cœur d'Hérault, la baisse des kilomètres parcourus de 1% a un effet favorable sur les émissions de GES totaux qui diminuent également de 1%. Les émissions de GES totaux sont corrélées aux consommations de carburants. Les émissions de polluants ont aussi diminué.

	Territoire	NO _x	PM ₁₀	PM _{2,5}	GES totaux	Kilomètres parcourus	Population
Evolution entre 2008 et 2023	Pays Cœur d'Hérault	-53%	-52%	-62%	12%	16%	24,5%
	Département 34	-57%	-50%	-61%	9%	13%	20,6%

→ Entre 2008 et 2023, la **baisse importante des émissions de NO_x et de particules à l'échappement** est principalement liée au renouvellement progressif du parc de véhicules roulants moins polluants, car dans la même période les kilomètres parcourus ont augmenté de 11%.

→ Les émissions de GES totaux, en lien avec les kilomètres parcourus, qui ont progressé de 16%, ont augmenté de 12%.

Répartition des émissions polluantes par type de voies



Source: ATMO_IRS_V9_2008_2023

ANNEXE 1 – ENJEUX MAJEURS

PAYS CŒUR D'HERAULT

Répartition des émissions polluantes par type de voies

	Type de voies	NOx	PM10	PM2.5	GES totaux	Kilomètres parcourus
2023	Autoroutes	74%	64%	67%	73%	67%
	Rocades et axes structurants	2%	2%	2%	2%	2%
	Routes départementales	18%	25%	23%	19%	24%
	Routes en milieu urbain	6%	9%	8%	6%	7%

- 67% des kilomètres parcourus se situent sur l'autoroute qui concentrent 74% des émissions de NOx, 64% des émissions de particules PM₁₀, 67% des particules PM_{2.5} et 73% des émissions de GES issues du trafic routier.
- 24% des émissions et des kilomètres parcourus concernent les routes départementales. Les émissions sont entre 18% pour les NOx et GES et de 23% à 25% pour les particules PM₁₀ et PM_{2.5}.
- 7% des kilomètres parcourus en 2023 sont localisés sur les routes départementales du territoire qui sont à l'origine de moins de 9% des émissions.

Répartition des émissions polluantes par type de voies

	Type de véhicules	NOx	PM10	PM2.5	GES totaux	Kilomètres parcourus
2023	Véhicules Particuliers/ 2 roues	58%	61%	63%	56%	77%
	Véhicules Utilitaires	34%	17%	17%	16%	15%
	Poids lourds	7%	22%	19%	27%	8%
	Bus	0,3%	1%	1%	1%	0,3%

- Sur le territoire du Pays Cœur d'Hérault, les trois quarts (77%) des kilomètres parcourus en 2023 sont réalisés par les véhicules particuliers et 2 roues, le reste par les véhicules utilitaires (15%) et les poids lourds (8%).
- La majorité des émissions de polluants atmosphériques et GES provient des véhicules particuliers et 2 roues : 58% des oxydes d'azote, 61% et 63% des particules PM₁₀ et PM_{2.5} respectivement et 56% des GES associés au transport routier.
- Les poids lourds, qui ne comptabilisent que 8% des kilomètres parcourus sur le territoire, émettent 7% des NOx, 22% des PM₁₀, 19% des PM_{2.5} et 27% des GES associés au transport routier, du fait de leur présence plus forte sur autoroute, de leur poids et des vitesses plus importantes.
- Les bus représentent environ moins de 1% des kilomètres parcourus et émettent moins de 1% des NOx, et 1% des GES, des PM₁₀, des PM_{2.5} associés au transport routier.

ANNEXE 1 – ENJEUX MAJEURS

PAYS CŒUR D'HERAULT


Diminuer les émissions de particules fines du chauffage résidentiel : un levier majeur pour réduire l'exposition aux PM_{2.5}

Le chauffage domestique au bois représente aujourd'hui un enjeu majeur pour les émissions de particules fines PM_{2.5}, particulièrement durant la période hivernale.

Les appareils anciens, peu performants ou mal utilisés peuvent générer des émissions importantes de particules fines PM_{2.5}.

À l'échelle nationale, le chauffage au bois constitue, en hiver, l'une des principales sources d'émissions de PM_{2.5}. Le Plan national relatif au chauffage au bois vise à atteindre entre 2020 et 2030, une baisse de plus de 30 % des émissions annuelles de particules fines PM_{2.5} issues du chauffage au bois à l'échelle nationale.

Répartition des émissions du secteur Résidentiel dues à la biomasse




Source: ATMO_IRS_V9_2008_2023

Sur le territoire du Pays Cœur d'Hérault, l'usage du bois dans le secteur résidentiel/tertiaire est de 17% en 2023 mais il représente 99% des émissions de particules PM₁₀ et PM_{2.5}. Les foyers ouverts et les anciens appareils à bûches émettent le plus de particules (18% des émissions pour 12,6% des équipements). D'autres facteurs aggravant comme un tirage insuffisant (air qui circule mal dans l'appareil), un bois trop humide et un entretien mal réalisé augmentent encore les émissions de particules.



Répartition des émissions de particules par type d'équipement de chauffage au bois - 2023 Pays Cœur d'Hérault



Source: ATMO_IRS_V9_2008_2023

Les inserts sont responsables de 57% des émissions de particules. Les appareils anciens achetés avant 2005 représentent 47% des équipements de chauffage au bois.

Le renouvellement des appareils anciens et l'amélioration des pratiques d'utilisation, la qualité du combustible, la limitation des foyers ouverts sont des actions qui contribuent à la réduction des émissions de particules issues du chauffage au bois.

Cet enjeu est d'autant plus important que la nouvelle directive européenne fixe un seuil annuel pour la protection de la santé de 10 µg/m³ pour les PM_{2.5} à compter de 2030, soit une division par plus de deux par rapport à la réglementation actuelle. Sur le territoire du Pays Cœur d'Hérault, ce seuil pourrait ne pas être respecté en 2030.

ANNEXE 1 – ENJEUX MAJEURS

PAYS CŒUR D'HERAULT

Comment agir sur les émissions et améliorer la qualité de l'air ?




Les évaluations quantitatives d'impact sanitaire (EQIS)¹ indiquent que si les recommandations OMS étaient respectées dans toutes les communes de la région Occitanie :

- Entre 160 et 2 800 nouveaux cas de maladies respiratoires chez l'enfant seraient évités chaque année
- Entre 240 et 4 300 nouveaux cas de maladies cardio-vasculaires, respiratoires ou métaboliques chez l'adulte seraient également évités.

Ces constats renforcent l'importance d'intensifier les efforts pour réduire encore les niveaux de pollution. Des actions doivent donc être engagées sur les secteurs du trafic routier et du chauffage résidentiel pour améliorer durablement la qualité de l'air et diminuer les effets néfastes sur la santé et le climat. Afin d'alimenter les réflexions de chaque citoyen et acteur public, Atmo Occitanie a étudié les impacts de deux actions portant sur les mobilités : la baisse des vitesses réglementaires et la réduction des distances en véhicules motorisés. Au regard des enjeux air/climat/énergie/santé, ces actions ont été évaluées en termes de consommations énergétiques, d'émissions de GES, NOx et PM_{2.5} et d'effets sur l'exposition de populations.

Baisser nos vitesses : réduction de la population exposée au seuil OMS

Sur le territoire du Pays Cœur d'Hérault, une baisse de la vitesse autorisée sur les routes actuellement à 110 km/h ou plus a un effet positif sur les émissions de polluants, les GES et la consommation de carburant du secteur du trafic routier du territoire. Au total, les émissions sur le réseau routier diminueraient d'environ 25% si les vitesses étaient réduites. Les gains les plus importants concernent les réductions de 20 km/h sur les voies à 130 km/h (autoroute).



⁽¹⁾ Estimation des bénéfices potentiels pour la santé d'une amélioration de la qualité de l'air ambiant en Occitanie. Santé publique France, janvier 2025

ANNEXE 1 – ENJEUX MAJEURS

PAYS CŒUR D'HERAULT

Comment agir sur les émissions et améliorer la qualité de l'air ?

Moins de kilomètres parcourus : un levier direct pour améliorer la qualité de l'air, le climat et la santé

Sur le territoire du Pays Cœur d'Hérault, les véhicules parcourent un peu plus de 1 407 millions de kilomètres par an. En 2023, la progression des kilomètres parcourus par rapport à 2022 est de -1,2%. 77% des kilomètres parcourus sont réalisés en véhicule particulier.

La réduction des kilomètres parcourus par les véhicules constitue l'un des leviers les plus efficaces pour diminuer simultanément les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de polluants atmosphériques et l'exposition des populations à la pollution de l'air.



En premier lieu, une baisse du trafic routier entraîne une diminution quasi proportionnelle des consommations de carburant et d'émissions de gaz à effet de serre. Chaque kilomètre évité permet également de réduire les émissions de polluants atmosphériques liés à la combustion, tels que les oxydes d'azote (NO_x) et les particules fines (PM₁₀ et PM_{2,5}), et limite les émissions de particules liées à l'usure des freins, des pneus et de la chaussée.


Enfin, la baisse du trafic routier se traduit par une diminution de l'exposition des populations à la pollution atmosphérique, en particulier dans les zones urbaines et à proximité des axes routiers.

Atmo Occitanie a ainsi analysé, pour le territoire du Pays Cœur d'Hérault, deux scénarios construits à partir des enseignements de la crise COVID :


- ➔ **Scénario « mobilité contrainte »** : il repose sur une reconduction de la baisse moyenne des distances parcourues par l'ensemble des véhicules observée durant la crise sanitaire. Il constitue une référence permettant d'évaluer l'effet d'une réduction massive et soudaine de la mobilité.
- ➔ **Scénario « mobilité acceptable »** : ce scénario plus prospectif, dont les résultats sont présentés ci-contre, correspond à une diminution équivalente à la moitié de baisse du scénario « mobilité contrainte ». Pour les véhicules particuliers, cette évolution est cohérente avec les évolutions attendues grâce à la mise en œuvre de la Loi d'Orientation des Mobilités (LOM), qui encourage la réduction de l'usage individuel de la voiture grâce à l'amélioration des transports publics, le développement du covoiturage, de l'usage du vélo,...

Ainsi, toute action visant à réduire les kilomètres parcourus, développement des mobilités actives, renforcement des transports collectifs, optimisation des déplacements ou aménagement du territoire, génère des bénéfices conjoints pour le climat, la qualité de l'air et la santé publique.


Impact des scénarios de baisse des kilomètres
Vallée de l'Hérault



Clermontois



Lodévois et Larzac



ANNEXE MÉTHODOLOGIQUE

INVENTAIRE RÉGIONAL DES ÉMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES ET GAZ À EFFET DE SERRE (GES)

Dans le cadre de l'arrêté du 24 août 2011 relatif au Système National d'Inventaires d'Emissions et de Bilans dans l'Atmosphère (SNIEBA), le **Pôle de Coordination nationale des Inventaires Territoriaux (PCIT)** associant :

- le Ministère en charge de l'Environnement ;
- l'INERIS ;
- le CITEPA ;
- les Associations Agréées de Surveillance de Qualité de l'Air

a mis en place un **guide méthodologique pour l'élaboration des inventaires territoriaux des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques**.

Ce guide constitue la référence nationale à laquelle chaque acteur local doit pouvoir se rapporter pour l'élaboration des inventaires territoriaux d'émission directe de polluants dans l'air. Les méthodologies par secteurs d'activités sont périodiquement mises à jour au niveau national en fonction des besoins identifiés.

Au travers des missions qui lui sont ainsi attribuées et des partenariats mis en place avec les acteurs du territoire, Atmo Occitanie réalise et maintient à jour un Inventaire Régional Spatialisé des émissions directes de polluants atmosphériques et des émissions de GES (scope 1 & 2), et de consommation d'énergie sur l'ensemble de la région Occitanie. L'inventaire des émissions référence une trentaine de substances avec les principaux polluants réglementés (NO_x, particules en suspension, NH₃, SO₂, CO, benzène, métaux lourds, HAP, COV, etc.) et les gaz à effet de serre (CO₂, N₂O, CH₄, etc.).

Cet inventaire des sources et quantités de polluants est notamment utilisé par les partenaires d'Atmo Occitanie sous forme d'indicateurs pour identifier la contribution des différents secteurs d'activité à la pollution de l'air, suivre l'évolution pluriannuelle des quantités émises, évaluer la situation de leur territoire au regard des objectifs locaux et nationaux et enfin évaluer l'impact des politiques publiques ou de scénarios d'évolution des activités locales à plus ou moins long terme.

Les consommations d'énergie et quantités annuelles d'émissions de polluants atmosphériques et GES sont ainsi calculées pour l'ensemble de la région Occitanie, à différentes échelles spatiales (EPCI, communes, ...), et pour les principaux secteurs et sous-secteurs d'activité.

ANNEXE MÉTHODOLOGIQUE

INVENTAIRE RÉGIONAL DES ÉMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES ET GAZ À EFFET DE SERRE (GES)

La méthodologie de calcul des émissions consiste en un croisement entre des données primaires d'activité (statistiques socioéconomiques, agricoles, industrielles, données de trafic...) issues d'acteurs locaux ou nationaux et des facteurs d'émissions issus de bibliographies nationales et européennes.

$$E_{s,a,t} = A_{a,t} * F_{s,a}$$

avec :

E : émission relative à la substance « s » et à l'activité « a » pendant la durée « t »


A : quantité d'activité relative à l'activité « a » pendant le temps « t » ;

F : facteur d'émission relatif à la substance « s » et à l'activité « a ».

schéma de synthèse de l'organisation du calcul des émissions de polluants
atmosphériques et gaz à effet de serre

Les données primaires, les modalités de leur prise en compte ainsi que l'origine des facteurs d'émissions utilisés sont décrits dans les éléments méthodologiques ci-dessous.

La figure ci-contre présente un schéma de synthèse de l'organisation du calcul des émissions de polluants atmosphériques et GES, et leur utilisation dans le cadre du dispositif intégré d'évaluation de la qualité de l'air :



ANNEXE MÉTHODOLOGIQUE

INVENTAIRE RÉGIONAL DES ÉMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES ET GAZ À EFFET DE SERRE (GES)

Le pouvoir de réchauffement global (PRG) représente l'impact d'un gaz à effet de serre sur le climat, en comparaison au CO₂ dont le PRG est fixé arbitrairement à 1. Cet indice, associé à chaque gaz à effet de serre, correspond au forçage radiatif cumulé sur une période donnée (la période de référence a été fixée à 100 ans dans le cadre de la CCNUCC et du Protocole de Kyoto) induit par une quantité de GES émise.

Le PRG permet de convertir les émissions des différents GES en "équivalent CO₂" (« eq CO₂ »). Cette conversion permet de comparer l'impact relatif des différents gaz à effet de serre sur le changement climatique et de définir des objectifs de réduction des émissions de GES à long terme dans une même unité pour tous les GES.

Le PRG de chaque GES est déterminé par le GIEC au fur et à mesure de ses rapports d'évaluation (Assessment Reports ou AR). Les PRG utilisés dans l'inventaire régional des émissions de GES en Occitanie sont ceux fournis par le sixième rapport du GIEC.

Les GES pris en compte dans l'inventaire régional des émissions en Occitanie et le PRG associé sont indiqués ci-contre.

Gaz à effet de serre	PRG
CO ₂	1
CH ₄	27,9
N ₂ O	273

Source : Sixième rapport d'évaluation du GIEC

Pour rappel, on classe les émissions de GES en trois catégories dites « *Scope* » (pour périmètre, en anglais).

- Scope 1** : Emissions directes ; il s'agit des émissions produites sur le territoire par les secteurs précisés dans l'arrêté relatif au PCAET : résidentiel, tertiaire, transport routier, autres transports, agricole, déchets, industrie, branche énergie hors production d'électricité, de chaleur et de froid. Elles sont le fait des activités qui sont localisées sur le territoire y compris celles occasionnelles (par exemple, les émissions liées aux transports à vocation touristique en période saisonnière, la production agricole du territoire, etc.). Les émissions associées à la consommation de gaz et de pétrole font partie du scope 1.
- Scope 2** : Emissions indirectes des différents secteurs liés à leur consommation d'énergie ; ce sont les émissions indirectes liées à la production d'électricité et aux réseaux de chaleur et de froid, générées sur ou en dehors du territoire mais dont la consommation est localisée à l'intérieur du territoire.
- Scope 3** : Emissions induites par les acteurs et activités du territoire ; elles peuvent faire l'objet d'une quantification complémentaire. Certains éléments du diagnostic portant sur les gaz à effet de serre peuvent faire l'objet d'une quantification complémentaire prenant plus largement en compte des effets indirects, y compris lorsque ces effets indirects n'interviennent pas sur le territoire considéré ou qu'ils ne sont pas immédiats.

ANNEXE MÉTHODOLOGIQUE

INVENTAIRE RÉGIONAL DES ÉMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES ET GAZ À EFFET DE SERRE (GES)

Éléments méthodologiques

Généralités

Version de l'inventaire

La nouvelle version de l'inventaire porte le numéro de version suivant :

ATMO_IRS_V9_2008_2023

Cette nouvelle version remplace donc les éléments transmis précédemment et cet intitulé de version est à rappeler pour toute utilisation ou diffusion des données associées.

Couverture temporelle

La nouvelle version de l'inventaire nommée ci-dessus couvre la période **2008 à 2023**. Les indicateurs sont actualisés pour chacune de ces années afin de prendre en compte les dernières données disponibles et les éventuelles évolutions méthodologiques. L'inventaire des émissions permet donc de fournir à partir de cette version l'estimation des quantités de polluants à l'échelle de la commune sur une période de 16 ans, pour l'ensemble des communes d'Occitanie.

Couverture spatiale

Les données couvrent l'ensemble de la Région Occitanie, avec une production des indicateurs à l'échelle de la commune. Tout regroupement de communes est ainsi possible à l'échelle des territoires d'intérêt pour l'évaluation des politiques publiques : l'EPCI, le département et la région, PETR, SCOT, Parc, etc.

Principales évolutions méthodologiques

Cette nouvelle version d'inventaire V9 prend en compte plusieurs évolutions méthodologiques et une actualisation des données d'entrée. Les principales évolutions sont présentées ci-dessous :

Facteurs d'émissions

L'actualisation des facteurs d'émissions nationaux par le CITEPA a été effectuée et prise en compte (Réf. : CITEPA, 2025. Rapport OMINEA –22.1 ; 22^{ème} édition). Les impacts majeurs sur les secteurs et sous-secteurs d'activité sont indiqués dans les éléments sectoriels ci-dessous.

ANNEXE MÉTHODOLOGIQUE

INVENTAIRE RÉGIONAL DES ÉMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES ET GAZ À EFFET DE SERRE (GES)

L'actualisation des facteurs d'émissions européens COPERT V (version 5.7.3) a été prise en compte dans le secteur routier.

Ces actualisations prennent en compte les facteurs d'émissions les plus récents pour l'ensemble des activités émettrices sur la région Occitanie et sur l'ensemble du territoire national.

● Secteurs résidentiel et tertiaire

Des parcs d'équipements de chauffage locaux, plus représentatifs que les données nationales utilisées précédemment, ont été pris en compte (enquêtes ADEME¹). Les équipements locaux sont globalement plus anciens que ceux pris en compte dans la version précédente de l'inventaire (parc national ; source CITEPA). Sur certains territoires, des parcs locaux issus des enquêtes de préfiguration du Fonds Air bois ont été pris en compte dans cette nouvelle version d'inventaire V9.

Une donnée de consommation de bois régionale (source : SDES) a été prise en compte. L'actualisation des données de degrés journaliers unitaires (DJU) a été effectuée.

Concernant le secteur tertiaire, la mise à jour de la base de données d'effectifs (produite à partir des bases CLAP, SIRENE, ACCOSS) a été effectuée, ainsi que la mise à jour des données des effectifs de la branche enseignement (open data).

● Secteur des transports

○ Transport routier

La composition des parcs statiques de véhicules départementaux (source : SDES 2024) a été prise en compte sur les axes hors autoroute. Le parc de véhicules roulants national (source : CITEPA 2023) a été conservé sur les axes autoroutiers. Au global, les parcs départementaux sont plus anciens que le parc national (source : CITEPA) utilisé dans la précédente version de l'inventaire (ATMO_IRS_V8_2008_2022).

¹ADEME. (2024). Situation du chauffage domestique au bois en 2022-2023 : État des lieux du parc, des consommations et des approvisionnements. <https://librairie.ademe.fr/7443-situation-du-chauffage-domestique-au-bois-en-2022-2023.html>

-Enquêtes de préfiguration du Fonds Air Bois (territoire PPA Toulouse et EPCI Montpellier Méditerranée Métropole)

ANNEXE MÉTHODOLOGIQUE

INVENTAIRE RÉGIONAL DES ÉMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES ET GAZ À EFFET DE SERRE (GES)

○ Transports autres que routier

Les émissions associées aux autres moyens de transports sont estimées en fonction des données d'activité qui sont disponibles à l'échelle locale ou nationale. Pour la zone portuaire de Port La Nouvelle, la méthodologie par défaut définie dans le PCIT 2 (dite « par port ») est utilisée. Cette méthodologie est basée sur les données de trafic de bateaux pour des types génériques de bateaux. Sur la zone de Sète-Frontignan, la poursuite du partenariat avec Port Sud de France permet l'acquisition de données détaillées concernant le trafic maritime et les activités portuaires annexes sur ce territoire. Ainsi, la méthodologie la plus détaillée définie dans le PCIT 2 (dite « par escale ») concernant le calcul des émissions polluantes associées au trafic maritime est intégrée à partir de 2019. Les émissions sont ensuite rétro-projetées jusqu'en 2008 à partir des données d'émissions nationales maritimes SECTEN du CITEPA, pour couvrir la période d'inventaire régional. Les consommations liées à l'activité portuaire sont également calculées à partir de 2019. Par ailleurs, la mise à jour des facteurs d'émissions OMINEA 22.1 sur les NAPFUE 203 et 204 impactent les émissions de NO_x sur ce secteur. Enfin, une complétion des données de consommations et une remise à jour de l'historique sur les données du sous-secteur pêche ont été effectuées.

Les partenariats en cours avec les grands aéroports régionaux permettent de poursuivre le calcul de consommations et d'émissions détaillées de toutes les activités aéroportuaires (aéronefs et sources au sol), sur les aéroports de Toulouse et Montpellier. Les données d'immatriculations et de consommations unitaires (OACI) des aéronefs mises à jour sont notamment prises en compte pour affiner les calculs. Les temps de roulage réels des appareils de l'aéroport Toulouse Blagnac ont été pris en compte.

● Secteur industriel

L'actualisation nationale des facteurs d'émissions (source : OMINEA 22.1) peut impacter les émissions des différents sous-secteurs industriels (en particulier le SNAP 06 : Utilisation de solvants et autres produits), sur l'ensemble de l'historique 2008-2023 des indicateurs régionaux. Une mise à jour des données d'émissions de particules provenant des carrières et fournies par la DREAL a été effectuée.

L'inventaire des émissions du secteur industriel a été complété par l'intégration de l'activité « épandage des boues » SNAP 09100. Les données des stations-service (SNAP 050503) ont été actualisées.

L'actualisation de la base de données d'effectifs (produite à partir des bases CLAP, SIRENE, ACCOSS) a également impacté les données de l'inventaire du secteur industriel.

ANNEXE MÉTHODOLOGIQUE

INVENTAIRE RÉGIONAL DES ÉMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES ET GAZ À EFFET DE SERRE (GES)

● Secteur traitement des déchets

Le secteur du traitement des déchets n'a pas fait l'objet d'évolution majeure. Les méthodologies appliquées sont celles préconisées dans la méthodologie nationale (guide PCIT). Les données de l'ORDECO (Observatoire Régional des Déchets et de l'Economie Circulaire en Occitanie) dont celles concernant les unités de méthanisation et de compostage ont été actualisées. Quelques correctifs sur les données d'émission de CO₂ sur l'activité « feu ouvert de déchets verts » ont été apportés.

● Secteur agricole

Le secteur agricole n'a pas fait l'objet d'évolution méthodologique particulière. Les données issues de la SAA (Statistiques Agricoles Annuelles) ont été mises à jour jusqu'en 2023. Une mise à jour de la SAU (superficie agricole utilisée) sur la période 2010-2019 a été faite en fonction du RGA (Recensement Général Agricole) 2020, impactant les données d'émissions NO_x, NH₃ et N₂O des activités de type cultures (SNAP 10005). Enfin, la tendance nationale de vente d'engrais année 2023 a été utilisée pour compléter les données régionales (source : UNIFA) utilisées dans la précédente version d'inventaire.

ANNEXE MÉTHODOLOGIQUE

INVENTAIRE RÉGIONAL DES ÉMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES ET GAZ À EFFET DE SERRE (GES)

Éléments par secteur

Secteur résidentiel

Producteur(s) données d'entrée	Type de données d'entrée, échelle géographique	Compléments données d'entrée	Traitement et/ou données en sortie	Facteurs émissions
Agence ORE (Opérateurs de Réseaux d'Énergie), SDES, CEREN)	Consommations d'énergie : - communales (gaz, électricité) - régionales (bois, fioul, GPL, chaleur urbaine)	-	Estimation d'un mix énergétique territorial + Emissions polluantes détaillées par type de logement selon ses caractéristiques	CITEPA 22.1 / CITEPA 21.1
INSEE (Détail Logement), SITADEL	Types de logement, de chauffage, énergie utilisée, par commune			
ADEME	Parcs régionaux et locaux d'équipements de chauffage au bois	- ADEME. (2024). Situation du chauffage domestique au bois en 2022-2023 : État des lieux du parc, des consommations et des approvisionnements. - Enquêtes de préfiguration du Fonds Air Bois (territoire PPA Toulouse et EPCI Montpellier Méditerranée Métropole)	Emissions polluantes associées à l'usage du bois énergie chez les particuliers	
Collectivités forestières Occitanie Pyrénées-Méditerranée dans le cadre de l'Observatoire Interrégional Bois-énergie Occitanie	Nombre et caractéristiques des chaufferies collectives biomasses alimentant des bâtiments résidentiels	-	Estimation des émissions polluantes associées aux chaufferies biomasse alimentant des logements	ADEME
Divers fournisseurs pour: population, taux d'équipements des ménages en petits outillages, vente de peintures, ...	Données d'activité hors combustion du secteur résidentiel	Données nationales désagrégées	Emissions polluantes des autres postes du secteur résidentiel (ex : peinture, tabac, engins de jardinage,...)	CITEPA 22.1

ANNEXE MÉTHODOLOGIQUE

INVENTAIRE RÉGIONAL DES ÉMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES ET GAZ À EFFET DE SERRE (GES)

Éléments par secteur

Secteur tertiaire

Producteur(s) données d'entrée	Type de données d'entrée, échelle géographique	Compléments données d'entrée	Traitement et/ou données en sortie	Facteurs émissions
Agence ORE (Opérateurs de Réseaux d'Énergie), SDES	Consommation d'énergie communale (gaz électricité), ou régionale (bois, fioul, GPL, chaleur urbaine)	-	Estimation d'un mix énergétique territorial	CITEPA 22.1
INSEE, Open data Occitanie, Base Emploi (CLAP, ACOSS, SIRENE)	Effectifs tertiaires (secteur d'activité : enseignement)		+	
			Emissions polluantes par branche tertiaire	
Collectivités forestières Occitanie Pyrénées- Méditerranée dans le cadre de l'Observatoire Interrégional Bois- énergie Occitanie	Nombre et caractéristiques des chaufferies collectives biomasses alimentant des bâtiments tertiaires	-	Estimation des émissions polluantes associées aux chaufferies biomasse alimentant des bâtiments tertiaires	ADEME

ANNEXE MÉTHODOLOGIQUE

INVENTAIRE RÉGIONAL DES ÉMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES ET GAZ À EFFET DE SERRE (GES)

Éléments par secteur

Secteur agricole

Producteur(s) données d'entrée	Type de données d'entrée, échelle géographique	Compléments données d'entrée	Traitement et/ou données en sortie	Facteurs émissions
AGRESTE, RGA, SAA, Enquêtes RICA, Enquêtes régionales (DRAAF),	Consommation énergétique des bâtiments, répartition des cultures et des cheptels par commune	RGA 2000 et 2010	Emissions polluantes associées aux cultures, à l'élevage, aux bâtiments, aux engins	CITEPA 22.1/ EMEP Guidebook
UNIFA	Ventes régionales d'engrais	Tendances nationales	Emissions polluantes associées à l'apport d'engrais	

Secteur industrie et traitement des déchets

Producteur(s) données d'entrée	Type de données d'entrée, échelle géographique	Compléments données d'entrée	Traitement et/ou données en sortie	Facteurs émissions
DREAL Occitanie	Données issues de l'exploitation des carrières	-	Emissions polluantes dues à l'extraction de roche	CITEPA 22.1
BDREP	Emissions déclarées des industriels	-	Emissions déclarées des industriels, corrections, complétion	
ORDECO, EACEI, partenaires d'Atmo Occitanie	Données d'activité industrielles / traitement des déchets par type	-	Emissions industrielles complémentaires, émissions dues aux traitements de déchets	
Viaseva, SDES	Annuaire des réseaux de chaleurs	-	Emissions associées à la production de chaleur urbaine	

ANNEXE MÉTHODOLOGIQUE

INVENTAIRE RÉGIONAL DES ÉMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES ET GAZ À EFFET DE SERRE (GES)

Éléments par secteur

Secteur des transports, transport routier

Producteur(s) données d'entrée	Type de données d'entrée, échelle géographique	Compléments données d'entrée	Traitement et/ou données en sortie	Facteurs émissions
CITEPA, SDES	Parcs statiques et roulants	Données annuelles	Calcul de facteurs d'émissions unitaires par type de véhicule	Méthodologie européenne COPERT (COMputer Program to calculate Emissions from Road Transport)
Gestionnaires routiers, partenaires d'Atmo Occitanie	Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA)	Données réelles de comptages routiers	Validation, affectation et historisation des données par tronçon de route, par type de route	
Autorités Organisatrices des Transports	Utilisation des transports en commun, données associées		Emissions polluantes dues au transport en commun (bus, car)	

Secteur des transports, autres transports

Producteur(s) données d'entrée	Type de données d'entrée, échelle géographique	Compléments données d'entrée	Traitement et/ou données en sortie	Facteurs émissions
Partenaires d'Atmo Occitanie secteur aérien (ATB, AMM)	Données détaillées d'activité des plateformes aéroportuaires : trafic aérien, temps de roulage, sources au sol	-	Emissions polluantes dues au trafic aérien et aux sources au sol (consommation des bâtiments, engins de pistes, ...)	EMEP Guidebook,
Union des Aéroports Français (UAF)	Données de trafic sur les autres aéroports en Occitanie	-	Emissions polluantes associées au trafic aérien des autres aéroports	
OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale)	Données de consommations unitaires (CU)	-	Emissions polluantes associées au trafic aérien des autres aéroports	CITEPA 22.1

ANNEXE MÉTHODOLOGIQUE

INVENTAIRE RÉGIONAL DES ÉMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES ET GAZ À EFFET DE SERRE (GES)

Secteur des transports, autres transports

Producteur(s) données d'entrée	Type de données d'entrée, échelle géographique	Compléments données d'entrée	Traitement et/ou données en sortie	Facteurs émissions
Partenaire d'Atmo Occitanie – infrastructures portuaires	Données détaillées d'activité sur la plateforme portuaire de Sète Frontignan	-	Emissions polluantes associées au trafic maritime sur la zone de Sète Frontignan	EMEP Guidebook/ CITEPA
Eurostat, Ifremer	Données de trafic maritime autres ports de commerce + ports de pêche	-	Emissions polluantes associées au trafic maritime sur les autres ports d'Occitanie	
SNCF	Trafic ferroviaire, caractéristiques des trains et du réseau ferré	-	Emissions dues au trafic ferroviaire	

ANNEXE MÉTHODOLOGIQUE

INVENTAIRE RÉGIONAL DES ÉMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES ET GAZ À EFFET DE SERRE (GES)

Objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques et GES – état des lieux

Polluants atmosphériques – PREPA

Le PREPA (Plan national de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques) est instauré par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (*Loi n° 2015-992 du 17 août 2015*). Il se compose d'un décret qui fixe les objectifs de réduction à horizon 2020, 2025 et 2030, conformément aux objectifs européens et d'un arrêté qui fixe les orientations et actions pour la période 2017-2021, avec des actions de réduction dans tous les secteurs (industrie, transports, résidentiel tertiaire, agriculture) :

Décret n° 2017-949 du 10 mai 2017 fixant les objectifs nationaux de réduction des émissions de certains polluants atmosphériques en application de l'article L. 222-9 du code de l'environnement.

Arrêté du 10 mai 2017 établissant le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques JO du 11 mai 2017, textes n° 24 et 37.

Il vise à réduire les émissions de polluants atmosphériques pour améliorer la qualité de l'air et réduire ainsi l'exposition des populations à la pollution. Il contribue ainsi aux objectifs de la directive européenne 2016/2284 CE du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, avec deux ans d'avance.

Le PREPA prévoit des mesures de réduction des émissions dans tous les secteurs, ainsi que des mesures de contrôle et de soutien des actions mises en œuvre. Il prévoit également des actions d'amélioration des connaissances, de mobilisation des territoires et de financement. Il est révisé tous les 5 ans et prévoit pour la période 2017-2021 pour la première fois un volet agricole.

Les polluants concernés par les engagements de la France sont ceux du protocole de Göteborg amendé en 2012 et de la directive 2016/2284/UE adoptée le 14 décembre 2016, remplaçant la Directive NEC, soit SO₂, NO_x, COVNM, PM_{2,5} et NH₃.

Les objectifs de réduction des émissions de ces polluants sont indiqués dans le Tableau 1. L'année de référence prise en compte est 2005 ou 2014 selon les études.

Polluants	2020	2025	2030	2020	2025	2030
	Par rapport aux émissions 2005			Par rapport aux émissions 2014		
SO ₂	-55%	-66%	-77%	Objectif atteint	-6%	-36%
NO _x	-50%	-60%	-69%	-19%	-35%	-50%
COVNM	-43%	-47%	-52%	Objectif atteint	-2%	-11%
NH ₃	-4%	-8%	-13%	-7%	-11%	-16%
PM _{2,5}	-27%	-42%	-57%	Objectif atteint	-12%	-35%

Tableau 1: Objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques définis dans le PREPA, année de référence 2005 et 2014 – Source : Évaluation ex-ante des émissions, concentrations et impacts sanitaires du projet de PREPA, CITEPA/INERIS/MEEM.

ANNEXE MÉTHODOLOGIQUE

INVENTAIRE RÉGIONAL DES ÉMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES ET GAZ À EFFET DE SERRE (GES)

Afin d'atteindre ces objectifs, le PREPA se décline au travers d'un scénario tendanciel (prospective de l'évolution des émissions sans actions spécifiques nouvelles mais avec des mesures dont les impacts ont lieu plusieurs années après leur mise en place), et d'un scénario contenant les actions spécifiques nouvelles de réduction des émissions. La mise en œuvre du PREPA se fait ainsi au travers d'actions spécifiques prioritaires estimées les plus efficaces au niveau environnemental.

Au niveau local, la cohérence des PCAET (Plans Climat Air Energie Territoire) engagés par les territoires avec la stratégie nationale est primordiale, il est donc important de prendre en compte ces objectifs dans la stratégie de réduction des émissions au niveau local.

Le PREPA a fait l'objet d'une révision en 2022, mais les objectifs de baisse préalablement définis n'ont pas été revus, seules les actions permettant de les atteindre ont été adaptées.

Gaz à effet de serre – SNBC

Introduite par la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV), la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) est la feuille de route de la France pour lutter contre le changement climatique. Elle donne des orientations pour mettre en œuvre, dans tous les secteurs d'activité, la transition vers une économie bas-carbone, circulaire et durable. Elle définit une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 2050 et fixe des objectifs à court-moyen termes : les budgets carbone. Elle a deux ambitions : atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 et réduire l'empreinte carbone de la consommation des Français. Les décideurs publics, à l'échelle nationale comme territoriale, doivent la prendre en compte.

Adoptée pour la première fois en 2015, la SNBC a été révisée en 2018-2019, en visant d'atteindre la neutralité carbone en 2050 ; l'ambition nationale a été rehaussée par rapport à la première SNBC qui visait le facteur 4, soit une réduction de 75 % de ses émissions GES à l'horizon 2050 par rapport à 1990 : désormais on parle de « facteur 6 » soit une division par 6 des émissions de GES en 2050 par rapport à 1990 (-83%).

Ce projet de SNBC révisée a fait l'objet d'une consultation du public du 20 janvier au 19 février 2020. La nouvelle version de la SNBC et les budgets carbone pour les périodes 2019-2023, 2024-2028 et 2029-2033 ont été adoptés par décret le 21 avril 2020.

La SNBC est révisée tous les 5 ans. Ainsi, la SNBC 3 est en cours d'élaboration et sera à paraître prochainement. Atmo Occitanie travaille actuellement dans le cadre de la préparation de la prochaine version d'inventaire (V10) à la prise en compte de la SNBC 3 dans les indicateurs.

ANNEXE MÉTHODOLOGIQUE

INVENTAIRE RÉGIONAL DES ÉMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES ET GAZ À EFFET DE SERRE (GES)

La SNBC 2 définit des objectifs sectoriels ambitieux pour 2050 comme détaillés ci-dessous (Source : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/19092_strategie-carbone-FR_oct-20.pdf)



BÂTIMENTS

OBJECTIFS de RÉDUCTION des ÉMISSIONS de GES PAR RAPPORT À 2015

2030 : -49%

2050 : **décarbonation complète**

COMMENT ?

- Recourir aux énergies décarbonées les plus adaptées à la typologie des bâtiments.
- Améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments (enveloppe et équipements) : nouvelles réglementations environnementales pour les bâtiments neufs en 2020 et pour la rénovation des bâtiments tertiaires ; 500 000 rénovations par an pour le parc existant, en ciblant les passoires énergétiques.
- Encourager des changements comportementaux pour des usages plus sobres.
- Promouvoir les produits de construction et de rénovation et les équipements à plus faible empreinte carbone (issus de l'économie circulaire ou biosourcés) et à haute performance énergétique et environnementale sur l'ensemble de leur cycle de vie.



TRANSPORTS

OBJECTIFS de RÉDUCTION des ÉMISSIONS de GES PAR RAPPORT À 2015

2030 : -28%

2050 : **décarbonation complète** (à l'exception du transport aérien domestique).

COMMENT ?

- Améliorer la performance énergétique des véhicules légers et lourds, avec un objectif de 4l/100 km réels en 2030 pour les véhicules particuliers thermiques.
- Décarboner l'énergie consommée par les véhicules et adapter les infrastructures pour atteindre 35 % de ventes de véhicules particuliers neufs électriques ou à hydrogène en 2030 et 100 % en 2040.
- Maîtriser la croissance de la demande pour le transport en favorisant le télétravail, le covoiturage, les circuits courts et en optimisant l'utilisation des véhicules.
- Favoriser le report vers les modes de transport de personnes et de marchandises les moins émetteurs (transports en commun, train) et soutenir les modes actifs (vélo...).



AGRICULTURE

OBJECTIFS de RÉDUCTION des ÉMISSIONS de GES PAR RAPPORT À 2015

2030 : -19%

2050 : -46%

COMMENT ?

- Développer l'agroécologie, l'agroforesterie et l'agriculture de précision, notamment pour réduire au maximum les surplus d'engrais azotés.
- Développer la bioéconomie pour fournir énergie et matériaux moins émetteurs de GES à l'économie française.
- Faire évoluer la demande alimentaire (produits de meilleure qualité ou issus de l'agriculture biologique, prise en compte des préconisations nutritionnelles) et réduire le gaspillage alimentaire.



FORÊT-BOIS ET SOLS

OBJECTIF

2050 : maximiser les puits de carbone (séquestration dans les sols, la forêt et les produits bois)

COMMENT ?

- Augmenter le stockage de carbone des sols agricoles via des changements de pratiques.
- Développer une gestion forestière active et durable, permettant à la fois l'adaptation de la forêt au changement climatique et la préservation des stocks de carbone dans l'écosystème forestier.
- Développer le boisement et réduire les défrichements.
- Maximiser le stockage de carbone dans les produits bois et l'utilisation de ceux-ci pour des usages à longue durée de vie comme la construction.
- Diminuer l'artificialisation des sols.



PRODUCTION D'ÉNERGIE

OBJECTIFS de RÉDUCTION des ÉMISSIONS de GES PAR RAPPORT À 2015

2030 : -33%

2050 : **décarbonation complète**

COMMENT ?

- Maîtriser la demande en énergie via l'efficacité énergétique et la sobriété.
- Décarboner et diversifier le mix énergétique, notamment via le développement des énergies renouvelables et la sortie du charbon dans la production d'électricité (dès 2022) et dans la production de chaleur.

L'évolution du mix énergétique et les objectifs d'efficacité énergétique sont déterminés dans la Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE). La PPE est fondée sur le même scénario de référence que la SNBC et est compatible avec ses orientations.



INDUSTRIE

OBJECTIFS de RÉDUCTION des ÉMISSIONS de GES PAR RAPPORT À 2015

2030 : -35%

2050 : -81%

COMMENT ?

- Accompagner les entreprises dans leur transition vers des systèmes de production bas-carbone (développement de feuilles de route de décarbonation, outils de financement). Soutenir l'émergence, en France, de moyens de production de technologies clés dans la transition.
- Intensifier la recherche et le développement de procédés de fabrication bas-carbone.
- Améliorer fortement l'efficacité énergétique et recourir à des énergies décarbonées.
- Maîtriser la demande en matière, en développant l'économie circulaire.


ANNEXE MÉTHODOLOGIQUE

INVENTAIRE RÉGIONAL DES ÉMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES ET GAZ À EFFET DE SERRE (GES)


Ainsi à horizon 2030, la réduction attendue des émissions de GES à l'échelle nationale est de -40% par rapport à 1990. En 2050, la neutralité carbone devrait être atteinte et 80Mt éq. CO₂ seraient émises, entièrement compensée par l'absorption (sols, forêts, ...).



Évolution des émissions et des puits de GES sur le territoire français entre 1990 et 2050 (en MtCO₂eq). Inventaire CITEPA 2018 et scénario SNBC révisée (neutralité carbone)



La SNBC s'appuie sur un scénario prospectif d'atteinte de la neutralité carbone à l'horizon 2050, sans faire de paris technologiques. Celui-ci permet de définir un chemin crédible de la transition vers cet objectif, d'identifier les verrous technologiques et d'anticiper les besoins en innovation.



L'information sur la qualité de l'air en Occitanie

www.atmo-occitanie.org



Agence de Montpellier
(Siège social)
10 rue Louis Lépine
Parc de la Méditerranée
34470 PEROLS

Agence de Toulouse
10bis chemin des Capelles
31300 TOULOUSE

Tel : 09.69.36.89.53
(Numéro CRISTAL – Appel non surtaxé)

Crédit photo : Atmo Occitanie